


QUÁ ĐAU ỒM ĐỂ ĐI HỌC?

Sau đây sẽ là sự hướng dẫn để chỉ ra làm sao để giúp bạn biết khi nào bạn hoặc con của bạn nên nghỉ ở nhà




Sốt

Sốt đến 100 độ F hoặc cao hơn. Trẻ có thể trở lại trường học khi không còn sốt nữa trong vòng 24 giờ (mà không sử dụng thuốc hạ sốt)




Nôn/tiêu chảy

Bất kỳ giải đoạn buồn nôn mà không giải thích được. Có thể buồn nôn trở lại 24 giờ sau lần cuối. Tiêu chảy đi ngoài phân lỏng ba lần hoặc nhiều lần trong vòng 24 giờ hoặc đi ngoài phân lỏng khởi phát đột ngột. Có thể trở lại trong vòng 24 giờ kể từ lần cuối cùng.




Ho

Nghiêm trọng, họ liên tục, khó thở



Phát ban

Phát ban kèm theo sốt. Có thể trở lại sau khi các vết phát ban đó không còn nữa hoặc có giấy phép được viết bởi nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe.



Tổn thương da/ lở loét

Vết khô từ chỗ bị loét không băng được hoặc vùng lở loét lan rộng hoặc vết lở loét mới phát triển ngày qua ngày



Khác

Triệu chứng ngăn ngừa học sinh tham gia tích cực vào hoạt động bình thường ở trường hoặc học sinh cần được chăm sóc nhiều hơn mà trường học có thể cung cấp một cách an toàn.

Ngôi nhà là nơi ở tốt nhất cho ai đó đang ốm đau(sốt)

Thông báo cho giáo viên của bạn nếu bạn hoặc con của bạn được chẩn đoán bệnh truyền nhiễm.